

Drop Elixer Hoestdrankmakers

INFORMATIE OVER DIT MIDDEL

Lees onderstaande informatie goed door voor u het middel gaat gebruiken!

Indien u iets niet duidelijk is, vraag dan uw apotheek of drogist om uitleg of ga naar onze website www.bronpharma.com of www.bronpharma.nl

Inhoudsopgave

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Samenstelling | 7. Dosering |
| 2. Toepassing | 8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens? |
| 3. Werking | 9. Geeft u borstvoeding? |
| 4. Gebruik dit middel NIET | 10. Combinatie met geneesmiddelen |
| 5. Mogelijke bijwerkingen | 11. Bewaring |
| 6. Gebruiksaanwijzing | 12. Extra informatie over hoest |

1. Samenstelling

Drop Elixer HM is speciaal voor u gemaakt. Deze bevat de volgende bestanddelen:

- Ammoniumchloride (=salmiak), ammoniakale anijsspiritus en zoethoutwortel (=drop)

Verder bestaat Drop Elixer HM uit de volgende hulpstoffen:

- natriumbenzoaat (E211), kaliumsorbaat (E202), citroenzuur (E330) en water
- Deze dropdrank bevat geen suiker, geen gluten, geen lactose en is parabeen vrij!

2. Toepassing

Drop Elixer HM wordt toegepast om een weldadig en verzachtend gevoel aan de keel te geven.

3. Werking

De zoethoutwortel (=drop) heeft een verzachtend effect op de keel en de ammoniumchloride (=salmiak) zorgt voor het verdunnen van het slijm in de luchtwegen.

4. Gebruik dit middel NIET:

- als u bij een eerder gebruik van middelen met ammoniumchloride (=salmiak) en/of zoethoutwortel (=drop) overgevoelighedsreacties heeft gehad, zoals huiduitslag.
- als u overgevoelighedsreacties heeft gehad op een van de andere bestanddelen.
- als u hoge bloeddruk of hartzwakte heeft, deze drank bevat namelijk drop, overleg dan met uw arts
- bij ernstige leveraandoening of nieraandoening. Raadpleeg dan uw arts.

5. Mogelijke bijwerkingen

Over het algemeen wordt dit middel goed verdragen. Onderstaande bijwerkingen kunnen soms optreden bij daarvoor gevoelige personen. Deze zijn meestal licht van aard. Neem contact op met uw arts, als u wel veel hinder van de bijwerkingen ondervindt of als u andere hinderlijke bijwerkingen ervaart. Als u vermoedt dat u een bijwerking hebt gekregen die niet in deze bijsluiter staat, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker

Soms: Misselijkheid en braken Overgevoelighedsreacties zoals huiduitslag. Die treden vooral op in het begin van de behandeling. Blijft u er ook enige dagen last houden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

6. Gebruiksaanwijzing

Als u Drop Elixer HM een keer vergeet in te nemen, moet u dit alsnog doen. Wanneer het bijna tijd is voor de volgende toediening wacht u dit af en gebruikt u de normale hoeveelheid. Als u per ongeluk teveel drank hebt ingenomen of als u kind van de drank heeft gesnoept, moet u contact opnemen met uw arts en/of apotheker.

Helpt Drop Elixer HM niet binnen 5 dagen of herhalen de klachten zich, dan moet u advies vragen aan uw arts.

Omschudden voor gebruik!

7. Dosering

- Kinderen van 3 tot 12 jaar: 3 – 4x daags 8 milliliter = 1 paplepel
- Kinderen > 12 jaar en Volwassenen: 3 - 4x daags 15 milliliter = 1 eetlepel
- niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen
- behalve als uw arts anders heeft voorgeschreven.

8. Bent u zwanger of heeft u kinderwens?

Dit middel is veilig te gebruiken als u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Heeft u echter tijdens uw zwangerschap hoge bloeddruk, de dropdrank alleen gebruiken na overleg met uw arts.

9. Geeft u borstvoeding?

Dit middel kan veilig worden gebruikt door vrouwen, die hun kind borstvoeding geven.

10. Combinatie met geneesmiddelen

Drop Elixer HM kan zonder problemen worden gecombineerd met andere geneesmiddelen. Meldt u het gebruik wel bij uw arts of apotheker.

11. Bewaring

Sluit de fles na gebruik goed af. Dit voorkomt bederf. Bewaar Drop Elixer HM buiten invloed van zonlicht bij kamertemperatuur. Drop Elixer HM is dan 6 maanden houdbaar na openen en ongeopend tot de datum die op het etiket is vermeld.

Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij uw drogist en/of apotheker in uw buurt of stel uw vragen in onze webshop www.bronpharma.nl

12. Extra informatie over hoest

Door te hoesten worden de luchtwegen gereinigd. Hoest ontstaat door een prikkeling van de luchtwegen veroorzaakt door rook, stof of diverse chemische stoffen. Maar ook een ontsteking of infectie aan de luchtwegen en het gebruik van bepaalde medicijnen kan veroorzaken.

Bij een productieve hoest wordt slijm opgehoest. Men spreekt dan ook wel van "slijmhoest". Gaat een slijmhoest gepaard met koorts, dan is er bijna altijd sprake van een luchtweginfectie.

Komt er geen slijm vrij bij het hoesten, dan spreekt men van "kriebelhoest" of "droge hoest".

Kriebelhoest is meestal het gevolg van een virusinfectie (verkoudheid, griep) of roken.

Door vaak hoesten ontstaat meestal een schrale keel en een schorre stem. Nog meer hoest kan hiervan weer het gevolg zijn.