

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om REUDOL SPAG. PEKANA® zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheek er om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

REUDOL SPAG. PEKANA®

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is REUDOL SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u REUDOL SPAG. PEKANA® gebruikt?
3. Hoe wordt REUDOL SPAG. PEKANA® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u REUDOL SPAG. PEKANA®?

Samenstelling van REUDOL SPAG. PEKANA®

De bestanddelen per 100 gram druppels zijn:

Arnica Montana spag.	D6	10,5 g
Bryonia cretica spag	D6	10,5 g
Colchicum autumnale	D12	14,5 g
Dulcamara	D4	14,5 g
Gnaphalium polycephalum	D4	12,5 g
Guajacum officinalis	D6	10,5 g
Lachnanthes tinctoria	D4	14,5 g
Taraxacum officinale spag	D4	12,5 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water.

Alcoholgehalte ca. 20% (v/v)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

PEKANA® Naturheilmittel GmbH,
Raiffeisenstrasse 15
D-88353 Kisslegg

Voor correspondentie en inlichtingen:

TIMM Health Care BV
Bosberg 41, 7271 LE Borculo
info@timmhealthcare.nl

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder
RVH 91671

1. Wat is REUDOL SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?

Toepassingen

REUDOL SPAG. PEKANA® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. Wat moet u weten voordat u REUDOL SPAG. PEKANA® gebruikt?

Wanneer mag u REUDOL SPAG. PEKANA® niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u REUDOL SPAG. PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met REUDOL SPAG. PEKANA®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met REUDOL SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van REUDOL SPAG. PEKANA® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik REUDOL SPAG. PEKANA® liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van REUDOL SPAG. PEKANA® in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt REUDOL SPAG. PEKANA® ingenomen/gebruikt?

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven:

Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

Kinderen (2-6 jaar): 3 maal daags 5 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 3 druppels.

REUDOL SPAG. PEKANA® bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van REUDOL SPAG. PEKANA® heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten REUDOL SPAG. PEKANA® in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van REUDOL SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met REUDOL SPAG.

PEKANA® wordt gestopt

Bij het stoppen van de behandeling met REUDOL SPAG. PEKANA® treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit geneesmiddel bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per 10 druppels.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van REUDOL SPAG. PEKANA® geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u REUDOL SPAG. PEKANA®?

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Na opening van de flacon is de inhoud nog 6 maanden houdbaar.

REUDOL SPAG. PEKANA® buiten bereik en zicht van kinderen houden!

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik REUDOL SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter “niet te gebruiken na” (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 09-2017.