



Naam produkt en farmaceutische vorm

EpiAnal, rectale crème
EpiAnal, zetpillen

Naam aanvrager/registratiehouder en plaats van vestiging

Will-Pharma B.V., Zwanenburg

Samenstelling

EpiAnal, rectale crème bevat per gram crème:

100 mg natriumoleaat
20 mg polidocanol
en als conserveermiddel
1 mg chloorcarvacrol.

EpiAnal, zetpillen bevatten per zetpil:

200 mg natriumoleaat
20 mg polidocanol
en als conserveermiddel
0,7 mg chloorcarvacrol.

Eigenschappen

Polidocanol is een lokaal anestheticum.

Indicaties

EpiAnal is bestemd om te worden gebruikt bij de symptomatische behandeling van niet-bloedende aambeien.

Contra-indicaties

Bloedende aambeien. Overgevoeligheid voor polidocanol of een van de andere bestanddelen van het produkt.

Bijwerkingen

Een gevoel van warmte en een branderig gevoel kunnen optreden. Chloorcarvacrol is een fenolderivaat. Fenolen kunnen gemakkelijk irritatie geven. Overdosering kan leiden tot het ontstaan van huidnecrose en ulceraties.

Waarschuwingen en voorzorgen

De aangegeven dosering mag niet worden overschreden en langdurig gebruik mag niet plaatsvinden dan na overleg met de behandelende arts. Ook bij aanhouden of terugkeren van de klachten en bij bloedende aambeien dient advies van de arts te worden ingewonnen.

EpiAnal rectale crème en zetpillen kunnen personen sensibiliseren voor polidocanol. Dit kan tot ernstige allergische reacties (anafylactische shock) aanleiding geven wanneer deze personen later worden gescleroseerd met een polidocanolbevattend sclerosans (bijvoorbeeld bij de behandeling van spataderen of aambeien).

Gebruik in zwangerschap en tijdens de lactatie

Dit geneesmiddel kan, voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens de lactatie.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen.

Beïnvloeding van deze functies valt niet te verwachten.

Dosering en wijze van gebruik

Bij klachten 's morgens en 's avonds één zetpil inbrengen of een weinig rectale crème aanbrengen.

Na elke stoelgang de anale opening eerst reinigen met zacht toiletpapier en dan met een washandje met lauw water. Daarna voorzichtig met een zachte handdoek afdrogen of - bij voorkeur - afbetten. Tenslotte één zetpil inbrengen of een weinig rectale crème aanbrengen.

Bewaring en houdbaarheid

EpiAnal moet bij kamertemperatuur (15-25 °C) worden bewaard.

Verpakkingen

Tubes met 30 gram EpiAnal rectale crème.

Strips met 6 EpiAnal zetpillen; twee strips in één handelsverpakking van 12 zetpillen.

RVG-nummer

EpiAnal, rectale crème, is in het register ingeschreven onder RVG 02751.

EpiAnal, zetpillen, is in het register ingeschreven onder RVG 02750.

oct 1990