

Zantac®

MAAGZUUR 3-in-1

Kauwtabletten • Glutenvrij • Lactosevrij

Toepassing

Zantac Maagzuur 3-in-1 is een medisch hulpmiddel gebaseerd op natriumalgiinaat, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, calciumcarbonaat en natriumhyaluroonaat. Het heeft een drievoudige werking; blokkeren van zure oprispingen, verminderen van brandend maagzuur en het beschermen van de slokdarm. Zantac Maagzuur 3-in-1 is voor de behandeling van maaginhoud, die terugstroomt naar de slokdarm (gastro-oesofageale reflux) ter vermindering van symptomen zoals brandend maagzuur, ook tijdens zwangerschap, (nachtelijke) reflux, zure oprispingen, slechte spijsvertering, hoesten en ontstekingen van het slijmvlies van het strottenhoofd en de keel.

Samenstelling

Natriumalgiinaat, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, calciumcarbonaat, sorbitol, natriumhyaluroonaat, plantaardig magnesiumstearaat, hydroxypropylcellulose, aroma, siliciumdioxide, sucralose, steviolglycosiden.

Hoe werkt Zantac Maagzuur 3-in-1

Zantac Maagzuur 3-in-1 is gebaseerd op natriumalginaten en carbonaten. Het dankt zijn werking aan een fysieke mechanische werking. Zodra natriumalgiinaat (natuurlijk polymeerextract uit bruine algen) in contact komt met de zuren in de maag zet het zich om in een gel. Tegelijkertijd laten de carbonaten carbonaatioxide vrij dat er voor zorgt dat de gel blijft drijven als een fysieke barrière die voorkomt dat maagzuur in de slokdarm komt. Daarnaast helpen de natriumbicarbonaten om maagzuur te neutraliseren. Het beschermt de slokdarm tegen de bijtende zuren dankzij de specifieke eigenschappen die een bescherm laag creëren. Dit bevordert het herstel van de slokdarm en helpt nieuwe zure oprispingen voorkomen. De formule met een specifieke balans tussen natriumalgiinaat en carbonaten werkt snel. Dit product bevat ook natriumhyaluroonaat, mucopolysaccharide met verzorgende en voedende eigenschappen die de slokdarm beschermen.

Gebruik en dosering

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: 2 of 4 tabletten na de maaltijd en voor het slapen gaan. Kauw de tabletten goed fijn. Na inname mag er water gedronken worden.

Waarschuwingen

Niet gebruiken na de vervaldatum zoals aangegeven op de verpakking. Niet gebruiken in geval van ernstig nierfalen. Bij overgevoeligheid voor één van de ingrediënten het product niet gebruiken. Als ongewenste bijwerkingen zich voordoen staak dan het gebruik en overleg met een arts. Het product kan de opname van orale geneesmiddelen beïnvloeden. In alle gevallen moet een tussenpoos van 2 uur tussen het innemen van dit product en andere medicatie worden aangehouden. Als de symptomen niet verbeteren na 7 dagen gebruik van dit product neem dan contact op met een arts. Dit product kan een opgeblazen gevoel geven. Wanneer de gebruiksinstructies worden gevolgd, wordt de kans hierop kleiner. Dit product bevat een hoeveelheid natrium die ongeveer gelijk staat aan 100 mg (4,4 mmol) en 36 mg calcium (0,9 mmol) per enkele dosering (2 tabletten van 1 gram). Neem contact op met een arts als u een zoutarm dieet volgt, bijvoorbeeld in het geval van overgevoeligheid, hartproblemen, nierproblemen of een leverfunctiestoornis en in het geval van hypercalciëmie, nefrocalcinose en terugkerende nierstenen.

Bewaren

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren tussen de 8°C en 25°C, niet bewaren in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.

Beschikbare verpakkingen: 20 1g kauwtabletten.



Biofarma, Via Castelliere 2,
Mereto di Tomba (UD), Italië

Distributeur:

Omega Pharma Nederland BV, Postbus 6612,
3002 AP Rotterdam, Nederland

Medisch hulpmiddel.

Zantac® is een geregistreerd handelsmerk van de GlaxoSmithKline-groep van bedrijven en wordt onder licentie gebruikt.

Datum aangepast

11/09/2020

(IFU1_09/20r0_09/20)