

NASIVIN® 0,5 mg/ml
DRUPPELS, SPRAY, DOSEERSPRAY
NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml
DOSEERSPRAY

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Wat is NASIVIN® / NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL?

Nasivin 0,5 mg/ml druppels, spray en doseerspray bevatten als werkzaam bestanddeel 0,5 mg/ml oxymetazolinehydrochloride. De vloeistof is kleurloos en bevat als conserveermiddelen benzalkoniumchloride en natriumedetaat. Andere hulpstoffen zijn natriumfosfaat, natriumhydroxide en water.

- NASIVIN® 0,5 mg/ml **druppels** is een druppelvloeistof voor in de neus en wordt geleverd in een flesje met pipet, het flesje bevat 10 ml vloeistof.
- NASIVIN® 0,5 mg/ml **spray** is een neusspray en wordt geleverd in een sprayflesje met 10 ml vloeistof. Het flesje bevat een luchtreservoir omdat voor het goed functioneren een bepaalde hoeveelheid lucht noodzakelijk is.
- NASIVIN® 0,5 mg/ml **doseerspray** is een neusspray en wordt geleverd in een flesje met een doseerpompje, het flesje bevat 10 ml vloeistof.

Nasivin® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml **doseerspray** bevat als werkzaam bestanddeel 0,5 mg/ml oxymetazoline-hydrochloride. Nasivin® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml doseerspray bevat geen conserveermiddelen. Hulpstoffen in de vloeistof zijn natriumfosfaat, natriumhydroxide en water.

- NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml doseerspray is een neusspray zonder conserveermiddelen en wordt geleverd in een flesje met een doseerpompje en bevat 15 ml vloeistof. Het spray-systeem voorkomt dat er lucht en verontreinigingen kunnen binnendringen bij de vloeistof. Hierdoor is de vloeistof houdbaar zonder conserveermiddelen.

Wat doet NASIVIN® / NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL?

Nasivin vermindert de zwelling van het neusslijmvlies zoals bij verkoudheid. De gezwollen slijmvliesen slinken omdat oxymetazolinehydrochloride in de neus een vaatvernauwende werking heeft. De werking bereikt het maximum na een half uur en houdt vier tot acht uur aan.

NASIVIN® wordt in Nederland in de handel gebracht door Merck BV te Amsterdam en is ingeschreven in het register: NASIVIN® 0,5 mg/ml druppels onder nummer RVG 00848, NASIVIN® 0,5 mg/ml spray onder nummer RVG 00849, NASIVIN® 0,5 mg/ml doseerspray onder nummer RVG 19073 en NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml doseerspray onder nummer RVG 22718.

Wanneer gebruikt u NASIVIN® / NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL?

Nasivin gebruikt u als u last heeft van een verstopte neus zoals bij verkoudheid.

Voordat u NASIVIN® / NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL gebruikt

Wanneer mag u NASIVIN® niet gebruiken?

Als u een ernstige hart- en/of vaatziekte heeft, overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Nasivin en/of last heeft van ontstoken, maar niet gezwollen neusslijmvlies dient u Nasivin niet te gebruiken. Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Nasivin te gebruiken.

Waar moet u op letten voordat u NASIVIN® 0,5 mg/ml gebruikt?

NASIVIN® 0,5 mg/ml is niet bestemd voor kinderen onder zes jaar. Patiënten met hoge bloeddruk, onregelmatig hartritme, suikerziekte, groene staar (glaucoom) en een voortdurend te lage bloeddruk kunnen beter voor gebruik een arts raadplegen.

Kunt u NASIVIN® 0,5 mg/ml samen met andere middelen gebruiken?

Het is niet aan te raden NASIVIN® 0,5 mg/ml te gebruiken als u bepaalde geneesmiddelen ter behandeling van depressie gebruikt, namelijk tricyclische antidepressiva. Raadpleeg hiervoor uw arts.

Mag u NASIVIN® 0,5 mg/ml gebruiken tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik van NASIVIN® 0,5 mg/ml tijdens de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding wordt alleen aangeraden na overleg met een arts.

Dosering en gebruik: volwassenen en kinderen vanaf zes jaar

- NASIVIN® 0,5 mg/ml **druppels**
Het gebruik is één tot drie maal daags twee tot drie druppels in elk neusgat, het maximale gebruik is 4-6 maal daags twee tot drie druppels in elk neusgat. Bij het indruppelen het hoofd achterover houden.
- NASIVIN® 0,5 mg/ml **spray**
Het gebruik is één tot drie maal daags één keer sprayen in elk neusgat, het maximale gebruik is 4-6 maal daags één keer sprayen in elk neusgat. Het beschermkapje van de spraypunt draaien. De kop van het flesje beurtelings in elk neusgat brengen, waarbij het hoofd licht voorover gebogen dient te worden.

Vervolgens de oplossing verstuiven door de zijwand van het flesje met de duim kort en stevig in te drukken, gelijktijdig inademend door de neus, terwijl men het andere neusgat dicht drukt. Na gebruik de spraypunt goed reinigen en het beschermkapje terugplaatsen.

- NASIVIN® 0,5 mg/ml **doseerspray** en NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml **doseerspray**

Het gebruik is één tot drie maal daags één keer sprayen in elk neusgat, het maximale gebruik is 4-6 maal daags één keer sprayen in elk neusgat.

Het beschermkapje van de spraypunt afnemen. Alleen bij het eerste gebruik meermalen indrukken totdat een gelijkmatige nevel ontstaat. De doseerspray is dan steeds gebruiksklaar. De spraypunt in het neusgat brengen, eenmaal sprayen en gelijktijdig inademen. Na gebruik de spraypunt goed reinigen en het beschermkapje terugplaatsen.

U mag Nasivin niet langer dan 7 dagen achter elkaar gebruiken. NIET INNEMEN! Indien u Nasivin vaker en/of langer wilt gebruiken dan de voorgeschreven dosering is het raadzaam een arts te raadplegen.

Heeft NASIVIN® / NASIVIN® ZONDER CONSERVEERMIDDEL bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen kunnen optreden: een branderig of droog gevoel in de neus en niezen. Ook kan het tegengestelde van het gewenste effect optreden: het gevoel een verstopte neus te krijgen. Bij mensen die er gevoelig voor zijn kunnen hartkloppingen en bloeddrukstijging optreden en zelden komen onrust, vermoeidheid en slapeloosheid voor. Mensen die gevoelig zijn voor conserveermiddelen, zoals benzalkoniumchloride en natriumedetaat wordt aangeraden om Nasivin® ZONDER CONSERVEERMIDDEL 0,5 mg/ml doseerspray te nemen. Als bijwerkingen zich voordoen moet u met het gebruik van Nasivin stoppen, eventueel kunt u uw arts of apotheker raadplegen. Waarschuw ook uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Bewaring en houdbaarheid

NASIVIN® moet bij kamertemperatuur (15 - 25°C) bewaard worden en is ongeopend houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum achter: Niet te gebruiken na:. Na opening kunt u Nasivin drie maanden bewaren. Buiten bereik van kinderen houden!

Maart 1999