

VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS
1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 18 september 2012
Bladzijde : 1

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml, drank
Noscapine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml inneemt
3. Hoe wordt Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken

- bij prikkelhoest.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML INNEEMT

Gebruik Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het

VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML
drank

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 18 september 2012
Bladzijde : 2

verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml en andere (genees)middelen.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml

Eén ml drank bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoesuur, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 18 september 2012

Bladzijde : 3

3. HOE WORDT VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML INGENOMEN

Volg bij het gebruik van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de drank niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u meer van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u teveel van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml om zo de vergeten dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Vicks Hoestdrank noscapinehydrochloride 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS
1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 18 september 2012
Bladzijde : 4

Afweersysteem

Overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Vicks Hoestdrank noscapihydrochloride 1 mg/ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Vicks Hoestdrank noscapihydrochloride 1 mg/ml

- Het werkzame bestanddeel is
noscapihydrochloride, 1 mg per ml drank.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoidenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet Vicks Hoestdrank noscapihydrochloride 1 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon à 150 en 300 ml drank.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Procter & Gamble Nederland B.V.

Watermanweg 100

3067 GG, Rotterdam

VICKS HOESTDRANK NOSCAPINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML
drank

MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS

1.3.3 : Bijsluiter

Datum : 18 september 2012

Bladzijde : 5

Fabrikant
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 102470, drank 1 mg/ml.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2012.

0912.2v.AP