

LEIDAPHARM KEELTABLETTEN CHLOORHEXIDINE

Brengt de keel tot rust!

Consumenteninformatie

Lees deze Consumenteninformatie aandachtig door, voordat u Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine gebruikt. Indien u algemene vragen heeft, stel deze dan aan uw drogist, arts of apotheker.

Wat zijn Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine?

Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine zijn zuigtabletten. Elke zuigtablet bevat 2,5 mg Chloorhexidine dihydrochloride.

Wat is de samenstelling van Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine?

Elke zuigtablet bevat 2,5 mg chloorhexidine dihydrochloride. Overige bestanddelen zijn: sorbitol (E420), xylitol (E967), mannitol (E421), hydroxypropylcellulose (E463), maltodextrine, citroenaroma, katoenzaadolie, magnesiumstearaat (E572), sucralose (E955).

Hoe helpen Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine?

Het bestanddeel chloorhexidine dihydrochloride brengt de keel tot rust en houdt de keel schoon. Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine zijn hierdoor weldadig en verzachtend voor de keel.

Hoe gebruikt u Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine?

Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine zijn geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen. Indien gewenst ieder uur 1 tablet langzaam opzuigen.

Waarschuwing

U mag Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine niet gebruiken bij overgevoeligheid voor chloorhexidine dihydrochloride of één van de andere bestanddelen. Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar. Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine kan voor zover bekend, overeenkomstig de Consumenteninformatie, met een gerust gevoel worden gebruikt tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding. Bij het (langdurig) gebruik van dit product bestaat geringe kans op onderstaande reacties: Huidirritatie; allergische reacties; bruine verkleuring van tong en tanden (de kans hierop wordt groter door het gelijktijdig gebruik van thee, koffie of wijn); verstoring in de smaakwaarneming; branderig gevoel van de tong; schraalheid; zwelling en pijn van het mondslimvlies; zwelling van bepaalde klieren bij het oor.

Bij klachten is het verstandig om uw arts te raadplegen.

Kunt u Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine samen met geneesmiddelen gebruiken?

Gebruik Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine niet met geneesmiddelen voor in de mond, tenzij u anders geadviseerd bent. De invloed van chloorhexidine dihydrochloride wordt nadelig beïnvloed door bestanddelen die in tandpasta aanwezig zijn. Tandpoetsen dient daarom geruime tijd voor of na het gebruik van Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine plaats te vinden.

Wat te doen indien u meer heeft gebruikt dan is aanbevolen?

Chloorhexidine dihydrochloride wordt bij inwendig gebruik nauwelijks opgenomen in het lichaam. Wij adviseren u echter bij inname van zeer grote hoeveelheden uw arts te raadplegen.

Hoe zijn de Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine verpakt?

In elke verpakking bevinden zich 20 Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine verpakt in doordrukstrips. Daarnaast bevat elke verpakking ook nog de Consumenteninformatie.

Hoe moeten de Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine worden bewaard?

U kunt Leidapharm Keeltabletten Chloorhexidine buiten het bereik van kinderen bewaren bij kamertemperatuur (15-25 °C) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum wordt op de verpakking vermeld na "Exp".

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:

Leidapharm B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

Deze consumenteninformatie is voor het laatst herzien in juli 2013.