

	<b>Claritine, tabletten 10 mg</b>	<b>RVG 13388</b>
	<b>Bijsluiter</b>	<b>Pagina 1/5</b>

## BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

### Claritine<sup>®</sup>, tabletten 10 mg

loratadine

**Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

#### **Inhoud van deze bijsluiter**

1. Wat is Claritine en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

### **1. WAT IS CLARITINE EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?**

De naam van uw geneesmiddel is **Claritine, tabletten 10 mg**.

#### **Wat is Claritine?**

Claritine bevat de werkzame stof loratadine, dat behoort tot de groep geneesmiddelen die “antihistaminica” worden genoemd.

#### **Hoe werkt Claritine?**

Dit middel helpt om uw allergische verschijnselen te verminderen door de effecten te stoppen die worden veroorzaakt door de stof “histamine”. Deze stof wordt aangemaakt in het lichaam als u ergens allergisch (overgevoelig) voor bent.

#### **Wanneer moet Claritine worden ingenomen?**

Dit middel verlicht de verschijnselen van allergische ontsteking van het neusslijmvlies (bijv. hooikoorts), zoals niezen, loopneus of jeukende neus en branderige of jeukende ogen. Claritine tabletten zijn geschikt voor volwassenen en kinderen van 2 jaar en ouder die meer dan 30 kilo wegen.

Dit middel kan ook gebruikt worden voor het verlichten van de verschijnselen van chronische urticaria (een vorm van huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes, ook wel netelroos genoemd).

Het effect van dit middel houdt een volledige dag aan, waardoor het zou moeten helpen uw normale dagelijkse bezigheden uit te voeren en bij het slapen.

Neem contact op met uw arts als u zich niet beter voelt, of als u zich slechter voelt.

	<b>Claritine, tabletten 10 mg</b>	<b>RVG 13388</b>
	<b>Bijsluiter</b>	<b>Pagina 2/5</b>

## **2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?**

### **Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?**

- U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

### **Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?**

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt als

- u een leveraandoening heeft
- u een allergietest op de huid moet ondergaan. Stop met het innemen van Claritine minstens 2 dagen voordat u een allergietest ondergaat. Dit geneesmiddel kan namelijk de uitkomst van de test beïnvloeden.

Indien een van bovenstaande situaties op u van toepassing is of als u twijfelt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

### **Kinderen**

Geef Claritine tabletten niet aan kinderen jonger dan 2 jaar oud of aan kinderen van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilogram of minder wegen. Er zijn andere vormen van Claritine beschikbaar voor kinderen van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilogram of minder wegen.

### **Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?**

Gebruikt u naast Claritine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift (recept) kunt krijgen.

### **Waarop moet u letten met alcohol?**

Het is gebleken dat dit middel de effecten van alcohol niet versterkt.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Neem dit middel niet in als u zwanger bent of als u borstvoeding wilt geven. Loratadine wordt in de moedermelk uitgescheiden.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Bij gebruik van de aanbevolen dosis wordt van dit middel niet verwacht dat u slaperig wordt of minder alert bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige mensen echter suf of slaperig worden, wat hun rijvaardigheid of vermogen om machines te gebruiken kan beïnvloeden.

### **Claritine tabletten bevatten lactose**

Claritine tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

## **3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?**

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

De breukstreep is er om de tablet te kunnen breken als u problemen heeft de hele tablet door te slikken.

	<b>Claritine, tabletten 10 mg</b>	<b>RVG 13388</b>
	<b>Bijsluiter</b>	<b>Pagina 3/5</b>

### Hoeveel moet u innemen?

#### **Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder:**

Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

#### **Kinderen van 2 tot 12 jaar worden gedoseerd op basis van hun gewicht:**

*Lichaamsgewicht van meer dan 30 kg:*

Neem eenmaal per dag 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel.

*Lichaamsgewicht van 30 kg of minder:*

Geef geen Claritine tabletten. Er zijn andere vormen van Claritine beschikbaar die geschikt zijn voor kinderen van 2 tot 12 jaar oud die 30 kilo of minder wegen.

Claritine wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 2 jaar.

#### **Volwassenen en kinderen met ernstige leverproblemen:**

*Volwassenen en kinderen die meer dan 30 kg wegen:*

Neem om de andere dag (1 keer per 2 dagen) eenmaal 1 tablet in met een glas water, met of zonder voedsel. Neem echter eerst contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel inneemt.

#### **Heeft u te veel van dit middel ingenomen?**

Wanneer u te veel van Claritine heeft ingenomen, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Er worden echter geen ernstige problemen verwacht: u kunt hoofdpijn krijgen, een versnelde hartslag hebben of zich slaperig voelen.

#### **Bent u vergeten dit middel in te nemen?**

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, doe dit dan zodra u eraan denkt, en ga daarna verder met uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van Claritine? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

## 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen die het vaakst gemeld werden bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar, zijn:

- Sufheid
- Hoofdpijn
- Toegenomen eetlust
- Problemen met slapen

De bijwerkingen die het vaakst gemeld werden bij kinderen van 2 tot 12 jaar, zijn:

- Hoofdpijn
- Zenuwachtigheid
- Vermoeidheid

De volgende zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn ook gezien sinds loratadine op de markt is:

- Ernstige allergische reactie (overgevoeligheid)

	<b>Claritine, tabletten 10 mg</b>	<b>RVG 13388</b>
	<b>Bijsluiter</b>	<b>Pagina 4/5</b>

- Duizeligheid
- Snelle of onregelmatige hartslag
- Misselijkheid
- Droge mond
- Maagklachten
- Leverproblemen
- Haaruitval
- Huiduitslag
- Vermoeidheid

### **Het melden van bijwerkingen**

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem, voor **Nederland**: Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb (website: [www.lareb.nl](http://www.lareb.nl)). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

### **5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?**

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
- Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
- Gebruik Claritine tabletten niet als u een verandering merkt aan het uiterlijk van de tabletten.
- Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

### **6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE**

#### **Welke stoffen zitten er in dit middel?**

- De werkzame stof in dit middel is loratadine. Iedere tablet bevat 10 mg loratadine.
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: lactosemonohydraat, magnesiumstearaat en maïszetmeel.

#### **Hoe zien Claritine tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?**

Claritine, tabletten 10 mg zijn witte tot gebroken witte, ovale tabletten met de inscriptie van een kolf in een schaal, een breukstreep en het getal '10' op de ene zijde en vlak aan de andere zijde.

Claritine, tabletten 10 mg zijn beschikbaar in doosjes met blisterverpakkingen van 2, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 60 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

#### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant**

*Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:*

Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

*Voor inlichtingen en correspondentie:*

Bayer HealthCare Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

	<b>Claritine, tabletten 10 mg</b>	<b>RVG 13388</b>
	<b>Bijsluiter</b>	<b>Pagina 5/5</b>

*Fabrikant:*

Schering-Plough Labo NV  
 Industriepark, 30  
 B-2220 Heist-op-den-Berg  
 België

Schering-Plough  
 Rue Louis Pasteur, 2  
 F-14200 Herouville Saint-Clair  
 Frankrijk

**Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen**

Claritine, tabletten 10 mg: RVG 13388.

**Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:**

Denemarken, Finland, Ierland, IJsland, Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Zweden: **Clarityn**  
 België, Luxemburg, Nederland: **Claritine**  
 Frankrijk, Griekenland, Spanje: **Clarityne**  
 Duitsland: **Lisino S**  
 Portugal: **Claritine, Alertrin**  
 Verenigd Koninkrijk: **Clarityn (Allergy)**

**Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2015.**

**Andere informatiebronnen**

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de volgende websites:

<http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/> (Nederland).