

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Mobilat nieuwe formule, hydrofiele crème	RVG 02722	
2 mg mucopolysaccharidepolysulfaat en 20 mg salicylzuur per gram crème		
1.3.1.3 Package Leaflet		1.3.1.3-1

Naam van het geneesmiddel

MOBILAT nieuwe formule, Hydrofiele crème

Samenstelling

De crème bevat per gram:

Werkzame bestanddelen:

mucopolysaccharidepolysulfaat 2 mg
salicylzuur 20 mg

Conserveermiddel:

Thymol 1 mg

Hulpstoffen:

Glycerol. - Acid. stearinic. - Eucerin. anhydric. - Alcohol myristilic. - Alcohol cetylstearyl. emulsif. - Monoethanolamin. - Isopropanol. - Aq. purif.

Verpakkingen

Tubes van 50 g en van 100 g
Hydrofiele crème

Geneesmiddelengroep

Mobilat is een cutaan (via de huid) toegepast hulpmiddel bij pijnlijke aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Fabrikant

Daiichi Sankyo Europe GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Duitsland

Mobilat Produktions GmbH
Luitpoldstrasse 1
85276 Pfaffenhofen
Duitsland

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Duitsland

Vergunninghouder

Healthypharm B.V.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2011-04	Authorisation	Disk: AO/061122	Rev. 3.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Mobilat nieuwe formule, hydrofiele crème	RVG 02722	
2 mg mucopolysaccharidepolysulfaat en 20 mg salicylzuur per gram crème		
1.3.1.3 Package Leaflet		1.3.1.3-2

Nieuwe Donk 3
4879 AC Etten-Leur
Nederland

Mobilat nieuwe formule is in het register ingeschreven onder:
RVG 02722.

Toepassingen

Mobilat wordt gebruikt als hulpmiddel bij de behandeling van sportblessures en letsels door ongevallen, zoals kneuzingen en verstuikingen.

Voordat u Mobilat gebruikt

Als u bij eerder gebruik van Mobilat of van salicylzuur en daarvan afgeleide stoffen overgevoeligheidsreacties hebt gehad, moet u dit preparaat niet gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

Mobilat kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht of de zuigeling overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt door vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mits niet toegepast op grote oppervlakken.

Beïnvloeding rijvaardigheid en het bedienen van machines

Het is onwaarschijnlijk dat Mobilat de rijvaardigheid beïnvloedt of de bekwaamheid om machines te bedienen en in de praktijk is dit ook nooit gemeld.

Waarop moet u verder letten?

Niet toepassen op beschadigde huidgedeelten (in wonden of zweren). Niet langdurig, op grote huidoppervlakken of onder afsluitend verband toepassen bij zuigelingen en kleuters of in geval van nieraandoeningen.

Aanwijzingen voor het gebruik

Eén- tot driemaal daags 5-15 cm crème (afhankelijk van de grootte van het letsel) op en rond het aangedane gebied aanbrengen en licht inmasseren. De crème kan ook onder verband worden toegepast. De behandeling heeft in de regel niet langer dan enkele dagen tot een week te worden voortgezet. Als de klachten na 2 weken niet verdwenen zijn moet u uw arts raadplegen. Gebruik nooit geneesmiddelen langer dan 14 dagen zonder overleg met uw arts.

Bijwerkingen

In zeldzame gevallen kan zich overgevoeligheid voordoen in de vorm van irritatie of roodheid van de huid.

De behandeling moet dan worden stopgezet, waarna de verschijnselen in de regel snel verdwijnen. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2011-04	Authorisation	Disk: AO/061122	Rev. 3.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands		Module 1 Administrative information and prescribing information
Mobilat nieuwe formule , hydrofiele crème	RVG 02722	
2 mg mucopolysaccharidepolysulfaat en 20 mg salicylzuur per gram crème		
1.3.1.3 Package Leaflet		1.3.1.3-3

Aanwijzingen voor het bewaren

Bewaar Mobilat bij kamertemperatuur (15-25°C).

De vervaldatum wordt voorafgegaan door “niet te gebruiken na:” en is als volgt aangeduid:
maand (01-12) - jaar (laatste 2 cijfers jaartal).

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2011.

Department of Regulatory Affairs	Date: 2011-04	Authorisation	Disk: AO/061122	Rev. 3.0	Approved MEB
-------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------	-----------------	---------------------