

Text for the package leaflet

Last text revision: 13.12.2013

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Neuraphyt, filmomhulde tabletten

Pictogramm

RVG 110368

Werkzame bestanddelen: Droog extracten van citroenmelisseblad, passiebloemkruid, valerianawortel

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Neuraphyt zorgvuldig volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw apotheker of drogist.
- Raadpleeg in ieder geval een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 2 weken gebruik van dit product.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Neuraphyt en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Neuraphyt inneemt
3. Hoe wordt Neuraphyt ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Neuraphyt
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NEURAPHYT EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Traditioneel kruidengeneesmiddel ter verlichting van symptomen van nerveuze spanning en stress en ter bevordering van de slaap. De toepassing berust uitsluitend op langdurigegebruikservaring en niet op klinisch bewijs.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NEURAPHYT INNEEMT

2.1. Neuraphyt mag niet ingenomen worden

Bij overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of voor een van de hulpstoffen.

2.2. Wees extra voorzichtig met Neuraphyt

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de balans tussen de werkzaamheid en de schadelijkheid van dit geneesmiddel bij kinderen. Daarom dient dit product niet te worden toegediend aan kinderen jonger dan 12 jaar.

Patiënten met een zeldzame, erfelijke galactose-intolerantie, Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactosemalabsorptie dienen dit geneesmiddel niet in te nemen.

2.3. Inname van Neuraphyt met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

Gelijktijdig gebruik met synthetische sedativa wordt afgeraden.

Aanwijzing:

Raadpleeg voor gebruik uw arts, apotheker of drogist als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

2.4. Inname van Neuraphyt met voedingsmiddelen en dranken

Tot dusver zijn er geen wisselwerkingen gerapporteerd.

2.5. Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend voor gebruik tijdens zwangerschap en lactatie. Het gebruik van Neuraphyt wordt dan ook afgeraden tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.

2.6. Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan ook bij het voorschreven gebruik het reactievermogen verminderen. Het wordt daarom afgeraden om binnen 2 uur na het innemen van Neuraphyt een auto te besturen, machines te bedienen of te werken zonder veilige ondersteuning.

3. HOE WORDT NEURAPHYT INGENOMEN

Tenzij anderszins voorgeschreven is de dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

-Ter verlichting van symptomen van nerveuze spanning en stress: 2 maal daags 2 filmomhulde tabletten innemen.

-Ter bevordering van de slaap: 2 à 3 filmomhulde tabletten innemen, een half uur tot een uur voor het slapen gaan.

Neuraphyt filmomhulde tabletten dient men in zijn geheel door te slikken zonder ze stuk te bijten, tegelijk met een voldoende hoeveelheid vloeistof (bij voorkeur een heel glas water).

Indien de symptomen aanhouden of verergeren na 2 weken continu gebruik, dient een arts geraadpleegd te worden.

Aanwijzing:

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Wat u moet doen als u meer van Neuraphyt heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer Neuraphyt ingenomen heeft dan u zou mogen, moet u bij de volgende keer met het innemen, zoals door de arts voorgeschreven of in de bijsluiter aangegeven staat, doorgaan.

Er zijn geen gevallen van overdosering gerapporteerd.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Neuraphyt in te nemen

Als u vergeten bent Neuraphyt in te nemen, moet u bij de volgende keer met het innemen, zoals door de arts voorgeschreven of in de bijsluiter aangegeven staat, doorgaan.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Neuraphyt bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Er kunnen maag- en darmklachten (zoals misselijkheid, abdominale krampen) of allergische huidreacties optreden. De frequentie hiervan is onbekend.

Bij het optreden van bijwerkingen moet het gebruik van het preparaat gestaakt worden en moet u een arts raadplegen. Deze kan de ernst bepalen en in voorkomende gevallen noodzakelijke verdere maatregelen nemen.

Aanwijzing:

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, apotheker of drogist.

5. HOE BEWAART U NEURAPHYT

Bewaar Neuraphyt filmomhulde tabletten niet bij een temperatuur van meer dan 25 °C.

Gebruik Neuraphyt niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de primaire verpakking en de buitenverpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Vraag uw arts of apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

6.1. Wat bevat Neuraphyt

Eén filmomhulde tablet bevat:

60 mg droog extract van *Melissa officinalis* L., folium (citroenmelisseblad) (5-6:1), extractiemiddel: water;

70 mg droog extract van *Passiflora incarnata* L., herba (passiebloemkruid) (6-7:1), extractiemiddel: ethanol (68% v/v);

70 mg droog extract van *Valeriana officinalis* L., radix (valeriaanwortel) (5-7:1), extractiemiddel: methanol (45% m/m).

Lijst van hulpstoffen: Cellulose microkristallijn, lactosemonohydraat, siliciumdioxide, maltodextrine, basisch gebutyleerd metacrylaat copolymeer, Indigokarmijn (E132), Macrogol 6000, magnesiumstearaat (van plantaardige oorsprong), Ponceau 4 R (E124), Povidon, talk, Titaniumdioxide (E171).

6.2. Hoe ziet Neuraphyt er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Violetten filmomhulde tabletten met een karakteristieke geur en smaak.

Standaard verpakkingen bevatten 25, 50 of 100 filmomhulde tabletten, verpakt in blisters (Alu/PVC/PVDC) in een kartonnen omdoos. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

6.3. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstraße 5
64295 Darmstadt
Duitsland

Voor inlichtingen:

Bayer B.V., Bayer HealthCare Consumer Care, Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht.

6.4. Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2014.

Afleverstatus UAD

In het register ingeschreven onder nummer RVG 110368

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl).