

**1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET**

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

NOSCAPINE HCl HOESTDRANK APOTEX 1 mg/ml, stroop
noscapine**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

- 1. Wat is noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt**
- 2. Wat u moet weten voordat u noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml inneemt**
- 3. Hoe wordt noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml ingenomen**
- 4. Mogelijke bijwerkingen**
- 5. Hoe bewaart u noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml**
- 6. Aanvullende informatie**

1. Wat is noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt**Geneesmiddelengroep**

Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

Gebruiken

- bij prikkelhoest.

2. Wat u moet weten voordat u noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml inneemt**Gebruik noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml niet**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor noscapine of voor één van de andere bestanddelen van noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml.

Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Wees extra voorzichtig met noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar gebruikt worden door bij kinderen/ouderen en speciale patiëntengroepen. De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

Gebruik van noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml met andere geneesmiddelen

Voor zover bekend bestaat er geen wisselwerking tussen het gebruik van noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml en andere (genees)middelen.



Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend.

Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml

Eén ml stroop bevat 0,745 g saccharose. Bij gebruik van de maximaal aanbevolen dosering (=30 ml) levert elke dosis 22,35 g saccharose. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Verder kan saccharose maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

Dit product bevat methylparahydroxybenzoesaat, dit kan allergische reacties veroorzaken (wellicht vertraagd) en in uitzonderlijke gevallen bronchospasme.

3. Hoe wordt noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml ingenomen

Volg bij het gebruik van noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Volwassenen

15-30 ml 3 tot 4 maal per dag (=24 uur).

Kinderen van 6-12 jaar

15 ml 2 tot 4 maal per dag.

Kinderen van 3-6 jaar

7,5 ml 2 tot 4 maal per dag.

Als u merkt dat noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De dosering dient u af te meten met de meegeleverde maatbeker. De aangegeven dosering niet overschrijden.

U mag de stroop niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

**Wat u moet doen wanneer u meer van noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml heeft ingenomen dan u zou mogen**

Wanneer u teveel van noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml in te nemen

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem

Overgevoelighedsreacties, zoals huiduitslag en irritatie van het oog of neusslijmvlies.

Zenuwstelsel

Sufheid, duizeligheid.

Maag- en darmstelsel

Misselijkheid.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "niet te gebruiken na" of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

6. Aanvullende informatie**Wat bevat noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml**

- Het werkzame bestanddeel is noscaphinehydrochloride, 1 mg per ml stroop.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn citroenzuur(E330), methylparahydroxybenzoaat(E218), saccharoïdenatrium, saccharose, frambozenessence, gezuiverd water.

Hoe ziet noscaphine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Flacon à 150 en 300 ml stroop.



Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland.

Fabrikant:

Pharmachemie BV
Postbus 552
2003 RN Haarlem
Nederland

Voor informatie:

Apotex Nederland BV
Postbus 408
2300 AK Leiden
Nederland
Tel. nr. 071 524 3100

In het register ingeschreven onder

RVG 21868=16680, noscapine HCl hoestdrank Apotex 1 mg/ml, stroop.

Deze bijsluiter is voor het laatst gewijzigd in oktober 2013.