

**12** **Wat te doen bij overschrijding van de aanbevolen dosering?**  
Het in één keer innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan leiden tot een zeer ernstige leverbeschadiging; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. In het geval van overdosering dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

**13** **Welke mogelijke bijwerkingen kunnen optreden?**

- Soms kunnen overgevoeligheidsreacties voorkomen, zoals huiduitslag, galbulten en koorts. Wanneer één van deze bijwerkingen zich voordoet, dient het gebruik van deze tabletten gestaakt te worden. Raadpleeg zonodig uw apotheker of (huis-)arts.
- Indien u of uw kind langdurig (meer dan) de maximale dagdosering paracetamol tabletten inneemt, kan leverbeschadiging optreden. Waarschuw uw apotheker of (huis-)arts indien bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiters.

**14** **Bewaren**  
De tabletten in de originele verpakking droog en niet boven 25°C bewaren.

#### Gebruiksdatum

De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking aangegeven uiterste gebruiksdatum. De vermelding 'EXP' op de strip betekent 'niet te gebruiken na'.

#### Vernietiging

Dit geneesmiddel valt niet onder de groep chemisch of gevaarlijk afval. Toch raden wij u aan om tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken naar uw apotheker of een verzamelpunt voor klein chemisch afval te brengen; zorgvuldige afvalverwerking is daardoor gewaarborgd.

#### Ten slotte

Bij twijfel kunt u altijd advies vragen bij uw apotheker of (huis-)arts.

#### Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen.

Juli 2012

AP/DRUGS/37/2003  
97.704.247-C  
30108.3

SAMENWERKENDE  
**APOTHEKERS**<sup>®</sup>

500 mg



## bij Pijn en bij koorts

Paracetamol 500 mg tabletten  
Samenwerkende Apothekers

20, 30 en 50 tabletten

**Volwassenen en  
kinderen vanaf 6 jaar**

**!** Voordat u of uw kind dit geneesmiddel gebruikt, is het belangrijk dat u deze bijsluiters goed leest. Als er iets niet duidelijk is, neem dan contact op met uw apotheker.

**1** **Samenstelling**  
**Per tablet:** 500 mg paracetamol als werkzaam bestanddeel.  
Overige bestanddelen zijn siliciumdioxide (E551), cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, maïszetmeel, zetmeel (gepregelatiniseerd) en natriumstearaat (E470a). De tabletten bevatten geen gluten, lactose of suiker.

**2** **Verpakking**  
Paracetamol 500 mg tabletten Samenwerkende Apothekers zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 20, 30 en 50 tabletten. Naast tabletten met 500 mg paracetamol zijn er ook zetabletten met paracetamol in diverse sterkten verkrijgbaar.

**3** **Hoe werkt dit geneesmiddel?**  
Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Het bestrijdt echter niet de oorzaak van pijn en koorts.

**4** **Verantwoordelijk voor het in de handel brengen**  
Paracetamol 500 mg tabletten Samenwerkende Apothekers is een product van Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam. Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 12253.

#### **5** Wanneer kan dit geneesmiddel worden gebruikt?

- Bij pijn en koorts bij griep en verkoudheid;
- kiespijn;
- hoofdpijn;
- spierpijn;
- menstratiepijn;
- spit;
- pijn en koorts na inenting;
- zenuwpijn.

Als de klachten aanhouden of terugkeren, raadpleeg dan uw apotheker of (huis-)arts.

**6** **Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt?**  
Bij overgevoeligheid voor paracetamol of één van de andere bestanddelen.

**7** **Zijn er beperkingen bij zwangerschap en borstvoeding?**  
Gebruik dit geneesmiddel tijdens zwangerschap en borstvoeding alleen na overleg met uw apotheker of (huis-)arts.

**8** **Heeft dit geneesmiddel invloed op het reactievermogen?**  
Dit geneesmiddel heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken.

#### **9** Zijn er wisselwerkingen bij gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen?

- Als u of uw kind nog andere geneesmiddelen gebruikt, is het raadzaam vooraf bij uw apotheker of (huis-)arts te vragen of de geneesmiddelen tegelijkertijd gebruikt kunnen worden.
- Een wisselwerking kan onder meer optreden bij langdurig gebruik van paracetamol met zidovudine (middel tegen aids); de kans op ongewenste bijverschijnselen wordt vergroot.
- Paracetamol kan de werking van chlooramfenicol (bepaald antibioticum) versterken.
- Bij langdurig gebruik van geneesmiddelen die de leverfunctie beïnvloeden, onder meer barbituraten (bepaalde middelen bij epilepsie), kan een overdosering met paracetamol ernstiger verlopen.

#### **10** Waarschuwingen en voorzorgen

- Langdurig of veelvuldig gebruik wordt afgeraden.
- Voorzichtigheid is geboden bij personen met lever- en/of nierfunctiestoornissen.
- Voorzichtigheid is eveneens geboden bij langdurig verslaving aan alcohol. De dosering mag dan niet hoger zijn dan 4 tabletten per 24 uur.
- Het in eenmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosering kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Toch dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.

#### **11** Dosering

leeftijd	per keer	max. per 24 uur
6-9 jaar	1/2 tablet (250 mg)	2-3 tabletten (1000-1500 mg)
9-12 jaar	1 tablet (500 mg)	3-4 tabletten (1500-2000 mg)
12-15 jaar	1 tablet (500 mg)	4-6 tabletten (2000-3000 mg)
vanaf 15 jaar	1-2 tabletten (500-1000 mg)	6 tabletten (3000 mg)

- Het laagste aantal tabletten dat maximaal per 24 uur mag worden ingenomen, is bedoeld voor de jongste kinderen in de betreffende leeftijdscategorie.
- Neem nooit de maximale dagdosering tabletten in één keer in, maar verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de 24 uur. De tijd tussen twee opeenvolgende doseringen moet minimaal 4 uur zijn.
- Tablet(-ten) doorslikken met voldoende water of in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed roeren en (laten) opdrinken.
- **Duur van de behandeling:** Gebruik deze tabletten maximaal 14 dagen achter elkaar. Houden de klachten aan, neem dan contact op met uw apotheker of (huis-)arts.