

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Virono 50 mg muco-adhesieve buccale tabletten aciclovir

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.
- Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Virono en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Virono en waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Virono bevat de werkzame stof aciclovir. Het medicijn hoort bij een groep medicijnen tegen een virus (antivirale middelen).

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van koortslip die steeds terugkomt (terugkerende herpes labialis) bij volwassenen met een afweersysteem dat normaal werkt. Koortslip wordt veroorzaakt door het herpes-simplexvirus. U moet dit medicijn meteen op uw tandvlees (niet op de werkelijke plaats van de koortslip) plaatsen bij de eerste klachten (brandend gevoel, tintelen, jeuk) of verschijnselen (rode kleur, zwelling).

Het virus veroorzaakt blaasjes of zweertjes. Vooral op de lippen maar soms ook op andere delen van het gezicht. De infectie met het virus kan actief worden als de afweer van uw lichaam minder goed werkt. Bijvoorbeeld omdat u verkouden bent of door andere infecties. De klachten kunnen ook ontstaan door sterk zonlicht, stress of ongesteldheid.

Dit medicijn zorgt ervoor dat het virus zich niet kan uitbreiden. Hierdoor wordt de infectie gestopt.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet gebruiken?

- U bent allergisch voor aciclovir of een van de andere stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.
- U bent allergisch voor melk of voor producten op basis van melk.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- U kunt dit medicijn per ongeluk doorslikken. Slikt u dit medicijn per ongeluk door? Drink dan een glas water.
- Is uw afweersysteem minder goed door een andere ziekte die de afweer van uw lichaam kapot maakt (bijvoorbeeld aids)? Of door een behandeling die de afweer van uw lichaam kapot maakt (bijvoorbeeld immunosuppressiva)? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt. U mag dit medicijn dan niet gebruiken.
- Het is niet bekend of dit medicijn werkt als u het gebruikt wanneer u al blaasjes heeft. Gebruik dit medicijn daarom alleen wanneer u de eerste klachten van een koortslip heeft (jeuk, rode kleur of tintelen).
- Heeft u vaak last van een koortslip (meer dan 4 per jaar)? Of heeft u de laatste tijd vaker last van een koortslip? Of breidt het uit naar andere delen op uw lichaam? Neem ook dan contact op met uw arts.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit medicijn niet gebruiken.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Virono nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Na het plaatsen van dit medicijn op uw tandvlees mag u eten en drinken zoals normaal.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn heeft naar verwachting geen effect op een ongeboren baby.

Maar uit voorzorg wordt geadviseerd dit medicijn alleen te gebruiken tijdens de zwangerschap als dat noodzakelijk is.

Borstvoeding

Het gebruik van dit medicijn tijdens borstvoeding heeft naar verwachting geen effect op een baby die borstvoeding krijgt. Maar uit voorzorg wordt geadviseerd dit medicijn alleen te gebruiken tijdens borstvoeding als dat noodzakelijk is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft geen of heel weinig invloed op hoe goed u kunt rijden en machines kunt gebruiken.

Virono bevat melkeiwitconcentraat met sporen van lactose en natriumlaurylsulfaat.

Heeft uw arts u verteld dat u niet goed tegen sommige suikers kunt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Dit medicijn bevat melkeiwit. Dat kan allergische reacties veroorzaken bij mensen met ernstige overgevoeligheid of allergie voor melkeiwit.

Virono bevat 5,2 mg natriumlaurylsulfaat per tablet.

Natriumlaurylsulfaat kan zorgen voor een reactie van uw huid op een deel van uw lichaam. Zoals een stekend of branderig gevoel. Het kan er ook voor zorgen dat reacties van uw huid door andere producten erger worden wanneer deze op dezelfde plek worden aangebracht.

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De geadviseerde dosering is 1 enkele tablet van dit medicijn per keer dat u last heeft van een koortslip. Breng het meteen nadat u de eerste verschijnselen of klachten van een koortslip heeft op het tandvlees aan.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

SLIK DIT MEDICIJN NIET DOOR.

Heeft u dit medicijn per ongeluk doorgeslikt? Drink dan een glas water.

Gebruiksaanwijzing voor goed gebruik

Is uw mond droog? Drink dan een beetje water om uw tandvlees nat te maken **voordat u de tablet plaatst**.

Hoe moet u dit medicijn aanbrengen?



Zoek eerst de plek op uw bovenste tandvlees boven de tweede voortand. Neem de tablet uit de blisterverpakking.

De tablet kan aan de rechter- of linkerkant worden aangebracht, ongeacht aan welke kant de eerste tekenen of symptomen van een koortslip verschijnen.



Plaats dit medicijn op het bovenste tandvlees (niet op de werkelijke plaats van koortslip), net boven de tweede voortand (gingivaal gebruik). Plaats de tablet met een droge vinger op uw tandvlees, meteen nadat u deze uit de blisterverpakking heeft gehaald. U zult merken dat de tablet een afgeronde kant heeft en een platte kant met daarop "AL21".

Plaats de tablet met de platte kant op de droge vingertop. Breng de ronde kant van de tablet aan op het bovenste tandvlees. Als de tablet aan de binnenkant van de lip plakt in plaats van aan het tandvlees, zal het medicijn nog steeds werken.



Houd de tablet op zijn plaats door 30 seconden zachtjes met uw vinger aan de buitenkant van uw bovenlip te drukken. Hierdoor blijft de tablet plakken.



De tablet blijft na het aanbrengen op zijn plaats vast zitten. De tablet lost tijdens de dag langzaam op.

Speciale aanbevelingen

Na het plaatsen van dit medicijn kunt u eten en drinken zoals normaal. U mag niet op de tablet zuigen of kauwen en u mag de tablet niet doorslikken.

Ga alle situaties uit de weg die ervoor kunnen zorgen dat dat tablet minder goed blijft plakken:

- Aanraken van of drukken op de tablet die al op zijn plaats is aangebracht.
- Kauwgom kauwen.
- Uw tanden overdag poetsen terwijl de tablet al op zijn plaats is aangebracht.

Heeft u per ongeluk een tablet van dit medicijn doorgeslikt?

- Drink dan een glas water.
- Heeft u de tablet binnen de eerste 6 uur na het plaatsen doorgeslikt? Dan mag u deze slechts 1 keer vervangen door een nieuwe tablet.

Blijft dit medicijn niet plakken of laat het los binnen de eerste 6 uur na plaatsen?

- Dan moet u dezelfde tablet meteen opnieuw op zijn plaats plakken.
- Kunt u de tablet niet opnieuw op zijn plaats plakken? Dan moet u een nieuwe tablet plaatsen.

Laat dit medicijn los of heeft u het per ongeluk doorgeslikt na langer dan 6 uur? Dan mag u de tablet niet vervangen door een andere tablet.

De vorm van de tablet kan veranderen door het opnemen van speeksel om zich zo aan de vorm van uw tandvlees aan te passen.

U kunt de gebruiksaanwijzing van Virono en specifieke aanbevelingen lezen door de QR-code op de etikettering te scannen met een smartphone/hulpmiddel. Dezelfde informatie is ook beschikbaar op de volgende URL: www.virono.nl/video.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar mogen dit medicijn niet gebruiken.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Neem meteen contact op met uw arts of apotheker. De kans op een overdosis is klein omdat er niet veel aciclovir in het bloed wordt opgenomen na het innemen van dit medicijn.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

- Hoofdpijn
- Pijn op de plaats van aanbrengen

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

- Duizelig zijn
- Misselijk zijn
- Irritatie op de plaats van aanbrengen
- Aften
- Pijnlijk tandvlees
- Rode kleur

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

- Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- Bewaren beneden 30 °C.
- Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos en

blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

- Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert, worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is: aciclovir. Elke muco-adhesieve buccale tablet bevat 50 mg aciclovir.
- De andere stoffen in dit medicijn zijn: hypromellose 2208, melkeiwitconcentraat met sporen van lactose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat, microkristallijne cellulose, povidon K30, watervrij colloïdaal siliciumdioxide.

Hoe ziet Virono eruit en wat zit er in een verpakking?

- Dit medicijn is een muco-adhesieve buccale tablet van 8 mm, wit tot lichtgeel met een afgeronde kant en een platte kant met daarop “AL21”.
- Elke kartonnen doos van dit medicijn bevat 1 of 2 eenheidsblisterverpakking(en) met 1 tablet.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Navamedic ASA, Henrik Ibsens gate 100, 0255 Oslo, Noorwegen

Fabrikant

Farméa
10 rue Bouché Thomas
ZAC d'Orgemont
49 000 Angers
Frankrijk

In het register ingeschreven onder:

RVG 133082

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

België, Luxemburg:	Vionox
Bulgarije, Polen:	Klavis
Frankrijk	Virpax
Groot-Brittannië (Noord-Ierland), Duitsland :	Sitavig
Spanje:	VIRMEN
Portugal : Herpmed	
Kroatië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Tsjechië, Roemenië, Slowakije:	Bravilon
Nederland:	Virono 50 mg muco-adhesieve buccale tabletten
Oostenrijk:	HerpesMed
Slovenië:	Vopir
Zweden, Finland, IJsland, Noorwegen, Denemarken:	Virono

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2026.