

Duofilm

BIJSLUITERTEKST: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ALGEMENE KENMERK

ALGEMENE KENMERKEN

Benaming

Duofilm

Samenstelling

Duofilm, bevat 167 mg/g salicylzuur en 167 mg/g melkzuur in een collodiumoplossing.

Farmaceutische vorm en inhoud

Oplossing voor gebruik op de huid. Duofilm wordt geleverd in een flacon met 15 ml oplossing voor gebruik op de huid.

Geneesmiddelengroep

Duofilm is bedoeld voor de behandeling van wratten.

Het actieve bestanddeel salicylzuur heeft effect op de hoornlaag van de huid waardoor het weefsel van de wrat wordt aangetast en tijdens de behandeling geleidelijk loslaat.

Registratiehouder: Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.

Finisklin Business Park

Sligo

Ierland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

030-6938100

nlinfo@gsk.com

Fabrikant:

Stiefel Laboratories Ltd., Finisklin Industrial Estate, Sligo, Ireland

In het register ingeschreven onder RVG

Duofilm, oplossing voor cutaan gebruik RVG 10867

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL

Duofilm wordt gebruikt bij wratten.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

Gevallen waarbij het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

Duofilm mag niet worden gebruikt:

- bij overgevoeligheid voor salicylaten
- op moedervlekken, wijnvlekken of andere, vreemd uitzienende wratten waar haar op groeit
- in het gezicht of op de geslachtsdelen
- op rode geïrriteerde of geïnfecteerde huid.

Nodige voorzorgen bij gebruik

Duofilm oplossing mag alleen op de wratten worden aangebracht. De actieve stof kan schade veroorzaken bij contact met gezonde huid. Als de oplossing toch op de omliggende gezonde huid komt dient deze direct met water en zeep te worden afgewassen. Was uw handen zeer zorgvuldig iedere keer nadat u de oplossing heeft aangebracht. Voorkom contact met de ogen en slijmvliezen. Indien u per ongeluk Duofilm oplossing in uw oog mocht krijgen, spoel dan zeer goed met water en raadpleeg een arts.

Bij zwangerschap

Duofilm oplossing voor gebruik op de huid, kan zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht volgens voorschrift tijdens de zwangerschap worden gegeven.

Rijvaardigheid

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te besturen. Een nadelig effect is echter niet aannemelijk.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Er zijn geen wisselwerkingen bekend.

Speciale waarschuwingen

Voorzichtig gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Diabetici of personen met een slechte doorbloeding dienen Duofilm te gebruiken in overleg met de arts.

Wratten zijn besmettelijk, daarom mogen de gebruikte materialen niet door anderen worden gebruikt. Loop bij een wrat op de voet nooit blootsvoets.

Net als andere geneesmiddelen dient Duofilm buiten het bereik van kinderen bewaard te worden. Duofilm mag niet bij open vuur worden gebruikt.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering en wijze van gebruik

Tekening 1

De wrat wordt gedurende ongeveer 5 minuten in heet water gehouden en daarna met een handdoek gedroogd.

Tekening 2

Gebruik een schone handdoek die niet door anderen wordt gebruikt, want wratten zijn besmettelijk.

Tekening 3




Met het bijgevoegde penseeltje wordt Duofilm op de wrat aangebracht. Laat dit enkele minuten drogen en breng Duofilm opnieuw op de wrat aan. Als Duofilm goed wordt verdragen kunt u met korte tussenpozen tot 4x toe opbrengen. Zorg ervoor dat Duofilm niet op de omliggende gezonde huid komt. Contact met de gezonde huid kan worden vermeden door voor gebruik de huid rondom de wrat te bedekken met een laagje vaseline crème. Als Duofilm naast de wrat op de huid wordt gemorst, veeg dan de druppel(s) meteen af en was met water en zeep.

Tekening 4

Dek een grote wrat of een wrat op de voet na de behandeling af met een pleister.

Tekening 5

De behandeling met Duofilm dient 1 maal daags te geschieden. Niet langer dan 2 weken gebruiken zonder advies van een arts.



Wat te doen bij overmatig gebruik

Overmatig gebruik van Duofilm op de huid kan vooral op de gezonde huid leiden tot verbranding. Indien dit het geval is dient u de behandeling te onderbreken en een verzachtende crème of lotion op te brengen.

Wat te doen bij onbedoelde inname

Duofilm is uitsluitend bedoeld voor uitwendige toepassing. Indien Duofilm echter toch wordt ingenomen dient u rekening te houden met misselijkheid, braken en buikpijn en dient direct een arts te worden gewaarschuwd. Toon de flacon en deze bijsluiter aan de arts.

BIJWERKINGEN

Er kan een branderig gevoel ontstaan, dat versterkt kan worden als Duofilm meerdere malen na elkaar wordt opgebracht. Op de huid rondom de wrat kunnen huidveranderingen optreden. Daarom dienen deze huidgedeelten bij de therapie te worden vermeden. Na beëindiging van de therapie met Duofilm verdwijnen deze huidveranderingen. U dient uw arts of apotheker te waarschuwen wanneer er bij u een bijwerking optreedt die niet staat vermeld in deze bijsluiter of indien u een bijwerking als ernstig ervaart.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Gebruik de Duofilm oplossing niet na de datum die op de verpakking staat genoemd bij "Niet gebruiken na" of "Exp."

Bewaar Duofilm oplossing voor gebruik op de huid bij kamertemperatuur (15 – 25°) en sluit de dop goed af na gebruik. Bewaar buiten bereik van kinderen.

Indien u na behandeling vloeistof overhoudt, gooi deze dan niet weg maar lever deze voor vernietiging in bij uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2010.