

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025

Bladzijde : 1

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, kauwtabletten

Magnesiumhydroxide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Magnesiumhydroxide Teva 724 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. WAT IS MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep

Magnesiumhydroxide Teva 724 mg behoort tot de groep van maagzuurbindende geneesmiddelen. Tevens heeft het een laxerende werking.

Gebruiken

- bij brandend maagzuur
- bij irritatie van de slokdarm
- bij maag- of darmzweer
- bij irritatie van de maagwand (gastritis)

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025

Bladzijde : 2

- wanneer de werking van uw nieren ernstig verminderd is

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- bij langdurig gebruik en bij een verminderde werking van de nieren. Er kan een teveel aan magnesium in het lichaam ontstaan. Kenmerken hiervan zijn: een vertraagde hartslag, verminderde ademhaling, verlaagde bloeddruk, misselijkheid, braken en coma.
- indien de klachten aanhouden, verergeren of terugkeren.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen

Bij kleine kinderen kan het gebruik van magnesiumhydroxide hypermagnesiëmie veroorzaken, vooral wanneer dit samengaat met nierinsufficiëntie of dehydratie.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Magnesiumhydroxide Teva 724 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sommige geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed door magnesiumhydroxide of kunnen invloed hebben op hoe goed magnesiumhydroxide werkt. Gebruikt u al salicylaten? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze kauwtabletten met:

- kinidine (een middel tegen ritmestoornissen van het hart)
- acetylsalicylzuur (een middel bij pijn)
- mycofenolzuur (een afweer onderdrukkend middel)

Met de volgende geneesmiddelen kan ook een wisselwerking optreden. Bij deze geneesmiddelen kan dat opgelost worden door deze middelen als eerste in te nemen, na enige tijd gevolgd door Magnesiumhydroxide Teva 724 mg. U hoeft dan geen advies van uw arts of apotheker te vragen. Hieronder staat per middel aangegeven hoe lang u het beste kunt wachten met innemen van Magnesiumhydroxide Teva 724 mg, na inname van het andere geneesmiddel.

- bisfosfonaten (middelen tegen botontkalking); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025

Bladzijde : 3

- cefpodoxim en cefuroxim (middelen van het cefalosporinetype, tegen infecties); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- antischimmelmiddelen (itraconazol en ketoconazol); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- penicillamine (een middel bij o.a. reuma en ziekte van Wilson); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- tetracyclines (bepaalde middelen tegen infecties, o.a. doxycycline, tetracycline, minocycline); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- schildklierhormonen; minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- hartglycosiden (middelen tegen hartzwakte, bv. digoxine); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- ijzerpreparaten (middelen tegen bloedarmoede); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- fluoriden (middelen tegen botontkalking); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen. Dit geldt NIET voor fluoride in een lage dosis, gebruikt ter voorkoming van cariës (tandbederf)
- chloorpromazine (een middel tegen o.a. een ernstige psychische stoornis); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- isoniazide (een middel tegen tuberculose); minimaal 2 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- cimetidine (een middel tegen maag- of darmzweren); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- bisacodyl (een middel tegen verstopping); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- middelen gebruikt bij HIV-infectie (amprenavir, indinavir, nelfinavir, zalcitabine, delavirdine); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- atropine (een middel tegen o.a. hartritmestoornissen); minimaal 1 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen
- chinolonen (bepaalde middelen tegen infecties, o.a. ciprofloxacin, levofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, pipemidinezuur); minimaal 4 uur voor Magnesiumhydroxide Teva 724 mg innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025

Bladzijde : 4

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Magnesiumhydroxide Teva bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per kauwtablet, dat wil zeggen dat het in wezen 'natriumvrij' is.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Bij brandend maagzuur, irritatie van de maag, irritatie van de slokdarm door oprisping van maagzuur, maag- of darmzweer: 1-2 kauwtabletten (724-1448 mg magnesiumhydroxide) 1 uur na elke maaltijd en bij het naar bed gaan. Zonodig vult u dit tussentijds aan met 1 tablet (724 mg magnesiumhydroxide) iedere 2 uur.

Als u merkt dat Magnesiumhydroxide Teva 724 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste eerst goed worden gekauwd en dan met een ruime hoeveelheid water (=1 glas) worden doorgeslikt.

Gebruik de kauwtabletten niet langer dan 14 dagen zonder uw arts daarover te raadplegen.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Magnesiumhydroxide Teva 724 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Magnesiumhydroxide Teva 724 mg om zo de vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025

Bladzijde : 5

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

- Diarree.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

- Niersteenvorming.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

- Hypermagnesiëmie. Dit werd waargenomen na langdurige toediening van magnesiumhydroxide aan patiënten met nierinsufficiëntie.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

- Buikpijn
- Botverweking (osteomalacie).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na opening van de pot nog 24 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025

Bladzijde : 6

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is magnesiumhydroxide, per tablet 724 mg (overeenkomend met 500 mg magnesiumoxide).
- De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn: gepregelatineerd zetmeel, natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose (E460), siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E572).

Hoe ziet Magnesiumhydroxide Teva 724 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking?

De kauwtabletten zijn wit, bol en hebben een doorsnede van 12,5 mm. Ze zijn voorzien van een breukstreep en code "TAS-YL".

Magnesiumhydroxide Teva 724 mg is verpakt in blisterverpakkingen à 100, 300, 400, 500 en 600 kauwtabletten, in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) kauwtabletten en in potten à 100, 250 en 1000 kauwtabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debrecen

Hongarije

Balkanpharma-Dupnitsa AD

Samokovsko Shosse Street 3

Dupnitsa 2600

Bulgarije

MAGNESIUMHYDROXIDE TEVA 724 MG
kauwtabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS
1.3.1 : Bijsluiter

Datum : 3 maart 2025
Bladzijde : 7

In het register ingeschreven onder
RVG 52077

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2025.

0325.8v.EV

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het CBG (www.cbg-meb.nl)