

Tout pour votre mobilité

FR Pour soutenir la formation du cartilage articulaire¹



Biocondil Glucosamine-chondroïtine

Biocondil se présente sous forme de comprimés et de sachets.
1 comprimé de **Biocondil** contient 750 mg de D-glucosamine HCl (625 mg de glucosamine), 600 mg de sulfate de chondroïtine et 20 mg de vitamine C (25% AR**).
1 sachet de **Biocondil** contient 1500 mg de D-glucosamine HCl (1250 mg de glucosamine), 1200 mg de sulfate de chondroïtine et 40 mg de vitamine C (50% AR**).
** Apport de référence.

LA GLUCOSAMINE
Le chlorhydrate de glucosamine est un produit très pur (>99%) et très stable. Il ne contient pas de sel ajouté (NaCl ou KCl) et présente l'avantage d'avoir une haute teneur en glucosamine.

LA CHONDROÏTINE
La chondroïtine appartient à la famille des glycosaminoglycanes. Elle est généralement utilisée en association avec le chlorhydrate de glucosamine.

LA VITAMINE C
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.

UTILISATION
Administration orale.
Comprimés : 2 comprimés par jour à prendre en une fois avec un verre d'eau, de préférence pendant le repas principal.
Sachets : 1 sachet par jour à dissoudre dans un verre d'eau (ou de jus d'orange ou de lait, ...), de préférence pendant le repas principal.

PRÉCAUTIONS
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

PRÉSENTATION
Emballages de 60, 180 ou 360 comprimés.
Emballages de 90 ou 180 sachets.
Existe aussi en DUOPACKS Biocondil + NC2 et Biocondil + Mobilityl Max



NC2 Collagène

NC2 est composé de collagène de type II natif (non dénaturé) et 12 mg de vitamine C (15% AR**).
** Apport de référence.

LE COLLAGÈNE DE TYPE II NATIF (NON DÉNATURÉ)
Le collagène de type II présent dans **NC2** est obtenu grâce à un procédé unique breveté (traitement à basse température) qui préserve la haute qualité de la protéine.
Ce type de fabrication permet de préserver la structure originale du collagène de type II sous sa forme native indispensable à son efficacité.

LA VITAMINE C
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.



Bioglucosamine Max Glucosamine

Bioglucosamine Max se présente sous forme de comprimés et de sachets, contenant 1500 mg de D-glucosamine HCl (1250 mg de glucosamine) et 20 mg de vitamine C (25% AR**).
** Apport de référence.

LA GLUCOSAMINE
Le chlorhydrate de glucosamine est un produit très pur (>99%) et très stable. Il ne contient pas de sel ajouté (NaCl ou KCl) et présente l'avantage d'avoir une haute teneur en glucosamine.

LA VITAMINE C
La vitamine C contribue à la formation normale de collagène pour assurer la fonction normale des cartilages.

UTILISATION
Administration orale. Convient aux vegans.
Comprimés : 1 comprimé par jour à prendre avec un verre d'eau, de préférence pendant le repas principal.
Sachets : 1 sachet par jour à dissoudre dans un verre d'eau (ou de jus d'orange ou de lait, ...), de préférence pendant le repas principal.

PRÉCAUTIONS
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou pharmacien.

PRÉSENTATION
Emballage de 90 comprimés.
Emballage de 90 sachets.

UTILISATION
Administration orale.
1 gélule par jour à prendre, à jeun, avec un verre d'eau. Afin d'obtenir une influence favorable, il est conseillé de maintenir la prise de **NC2** dans le temps. L'aspect de la poudre contenue dans la gélule peut varier sensiblement sans altérer la qualité et l'efficacité du produit.

PRÉSENTATION
Emballages de 30 et 90 gélules.
Existe aussi en DUOPACK Biocondil + NC2

FR Pour soutenir la souplesse articulaire²



Mobilityl Max Piperine free Une combinaison de 4 plantes

Mobilityl Max se présente sous forme de comprimés, contenant 588,75 mg d'extraît de *Curcuma longa* contenant 500 mg de curcuminoïdes. 61,25 mg d'extraît de *Kaempferia galanga*. 50 mg d'extraît de *Boswellia serrata* contenant 8,75 mg d'AKBA (acetyl-11-keto-β-boswellic acid). 50 mg d'huile de *Piper nigrum* contenant 32,5 mg de β-caryophyllène. 13,2 mg de vitamine C (ascorbate de sodium, 16,5% AR¹).
** Apport de référence

CURCUMA
L'extraît de curcuma breveté, le BCM-95®, associe les curcuminoïdes aux huiles volatiles du curcuma pour une biodisponibilité naturellement améliorée.
Anthony B. et al., 2008
L'extraît de curcuma contribue au maintien de la flexibilité articulaire.

BOSWELLIA SERRATA
L'extraît de *Boswellia serrata*, contient des huiles essentielles et quatre acides boswelliques, dont l'AKBA (acide 3-acetyl-11-ceto-β-boswellique).

KAEMPFERIA GALANGA
Le rhizome de *Kaempferia galanga* est naturellement riche en huiles essentielles et en éthyl-p-methoxycinnamate, un principe actif puissant.

PIPER NIGRUM
L'huile de *Piper nigrum* contient du β-caryophyllène qui active sélectivement les récepteurs cannabinoïdes-2 (CB2).

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES • PRÉCAUTIONS : Ne pas dépasser la portion journalière recommandée. Ne se substituer pas à un régime alimentaire équilibré et varié ainsi qu'à un mode de vie sain.



LA VITAMINE C
La vitamine C contribue à la formation normale du collagène pour la fonction normale des cartilages.

UTILISATION
Administration orale.
1 comprimé par jour à prendre avec un verre d'eau. Afin d'obtenir une influence favorable, il est conseillé de maintenir la prise de **Mobilityl Max** dans le temps. Convient aux vegans.

PRÉCAUTIONS
Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas d'usage concomitant d'anticoagulants. Il y a lieu de recueillir l'avis d'un médecin en cas de maladies du foie ou de la vésicule biliaire ou en cas d'usage concomitant de médicaments. Ne pas utiliser chez les femmes enceintes ou allaitantes ni chez les enfants de moins de 18 ans.

PRÉSENTATION
Emballages de 30, 90 et de 180 comprimés.
Existe aussi en DUOPACK Biocondil + Mobilityl Max

CONSERVATION : Tenir hors de portée des enfants. À conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. À consommer de préférence avant la date figurant sur l'emballage.

Alles voor uw mobiliteit

NL Om de vorming van kraakbeen te ondersteunen¹



Biocondil Glucosamine-chondroïtine

Biocondil wordt aangeboden in de vorm van tabletten en zakjes.
1 tablet **Biocondil** bevat 750 mg D-glucosamine HCl (625 mg glucosamine), 600 mg chondroitinesulfaat en 20 mg vitamine C (25% RI**).
1 zakje **Biocondil** bevat 1500 mg D-glucosamine HCl (1250 mg glucosamine), 1200 mg chondroitinesulfaat en 40 mg vitamine C (50% RI**).
** Referentie-inname.

GLUCOSAMINE
Glucosaminehydrochloride is een zeer zuiver (> 99%) en zeer stabiel product. Het bevat geen toegevoegd zout (NaCl of KCl) en biedt het voordeel een hoog gehalte aan glucosamine te bevatten.

CHONDROÏTINE
Chondroïtine behoort tot de familie van de glycosaminoglycanen. Het wordt meestal gebruikt in combinatie met glucosaminehydrochloride.

VITAMINE C
Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale werking van het kraakbeen te garanderen.

GEBRUIK
Orale inname.
Tabletten: 2 tabletten per dag, in één keer te nemen met een glas water, bij voorkeur tijdens de hoofdmaaltijd.
Zakjes: 1 zakje per dag. De inhoud oplossen in een glas water (of sinaasappelsap, melk ...), bij voorkeur tijdens de hoofdmaaltijd.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als u een bijwerking van welke aard ook ondervindt, praat er dan over met uw arts of apotheker.

VERPAKKING
Verpakkingen met 60, 180 of 360 tabletten.
Verpakkingen met 90 of 180 zakjes.
Ook beschikbaar als DUOPACKS Biocondil + NC2 en Biocondil + Mobilityl Max



NC2 Collageen

NC2 bestaat uit natief (niet gedetermineerd) type II-collageen en 12 mg vitamine C (15% RI**).
** Referentie-inname.

NATIEF (NIET GEDENATUREERD) TYPE II-COLLAGEEN
Het type II-collageen van **NC2** wordt verkregen dankzij een uniek gepatenteerd proces (behandeling bij lage temperatuur) waarbij de hoge kwaliteit van het eiwit behouden blijft.
Dankzij deze productiemethode behoudt het type II-collageen zijn oorspronkelijke structuur in zijn native vorm, die onmisbaar is voor de werkzaamheid ervan.

VITAMINE C
Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale werking van het kraakbeen te garanderen.



Bioglucosamine Max Glucosamine

Bioglucosamine Max is verkrijgbaar in de vorm van tabletten en zakjes met 1500 mg D-glucosamine HCl (1250 mg glucosamine) en 20 mg vitamine C (25% RI**).
** Referentie-inname.

GLUCOSAMINE
Glucosaminehydrochloride is een zeer zuiver (> 99%) en zeer stabiel product. Het bevat geen toegevoegd zout (NaCl of KCl) en biedt het voordeel een hoog gehalte aan glucosamine te bevatten.

VITAMINE C
Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen om de normale werking van het kraakbeen te garanderen.

GEBRUIK
Orale inname. Geschikt voor veganisten.
Tabletten: 1 tablet per dag, in te nemen met een glas water, bij voorkeur tijdens de hoofdmaaltijd.
Zakjes: 1 zakje per dag. De inhoud oplossen in een glas water (of sinaasappelsap, melk ...), bij voorkeur tijdens de hoofdmaaltijd.

VOORZORGSMAATREGELEN
Als u een bijwerking van welke aard ook ondervindt, praat er dan over met uw arts of apotheker.

VERPAKKING
Verpakking met 90 tabletten.
Verpakking met 90 zakjes.

GEBRUIK
Orale inname.
1 capsule per dag, nuchter in te nemen met een glas water. Om een gunstige invloed te ervaren, raden we aan om **NC2** lange tijd te nemen. Het uiterlijke aspect van het poeder in de capsule kan sterk variëren. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit en de werkzaamheid van het product.

VERPAKKING
Verpakkingen met 30 of 90 capsules.
Ook beschikbaar als DUOPACK Biocondil + NC2

NL Om de gewrichten soepel te houden²



Mobilityl Max Piperine free Combinatie van 4 planten

Mobilityl Max wordt aangeboden in de vorm van tabletten met 588,75 mg *Curcuma longa*-extract met 500 mg curcuminoïden. 61,25 mg *Kaempferia galanga*-extract. 50 mg *Boswellia serrata*-extract met 8,75 mg AKBA (acetyl-11-keto-β-boswellinezuur). 50 mg *Piper nigrum*-olie met 32,5 mg β-caryofylleen. 13,2 mg vitamine C (natriumascorbaat, 16,5% RI¹).
** Referentie-inname

KURKUMA
Het gepatenteerde kurkuma-extract BCM-95® combineert curcuminoïden met vluchtige oliën van kurkuma voor een biologische beschikbaarheid die op een natuurlijke manier is verbeterd.
Anthony B. et al., 2008
Het extract van kurkuma draagt bij tot het behoud van soepele gewrichten.

BOSWELLIA SERRATA
Het extract van *Boswellia serrata* bevat etherische oliën en vier boswelliazuren, waaronder AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswelliazuur).

KAEMPFERIA GALANGA
De wortelstok van de *Kaempferia galanga* is van nature rijk aan etherische oliën en ethyl-p-methoxycinnamaat, een krachtig actief bestanddeel.

PIPER NIGRUM
De olie van *Piper nigrum* bevat β-caryofylleen, dat selectief de cannabinoïde-2-receptoren (CB2) activeert.

VOEDINGSUPPLEMENTEN • VOORZORGSMAATREGELEN: Overschrijd de dagelijks aanbevolen hoeveelheid niet. Vervangt geen gevarieerde en evenwichtige voeding of gezonde levensstijl.



VITAMINE C
Vitamine C draagt bij aan de normale vorming van collageen voor de normale werking van het kraakbeen.

GEBRUIK
Orale inname.
1 tablet per dag, in te nemen met een glas water. Om een gunstige invloed te ervaren, raden we aan om **Mobilityl Max** lange tijd te nemen. Geschikt voor veganisten.

VOORZORGSMAATREGELEN
Raadpleeg uw arts of apotheker in geval van gelijktijdig gebruik van antistollingsmiddelen. Raadpleeg een arts indien u aan ziekten van lever of galblaas lijdt of bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen. Niet gebruiken bij zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of kinderen jonger dan 18 jaar.

VERPAKKING
Verpakkingen van 30, 90 en 180 tabletten.
Ook beschikbaar als DUOPACK Biocondil + Mobilityl Max

BEWARING: Buiten het bereik van kinderen houden. In zijn oorspronkelijke verpakking en op een koele en droge plaats bewaren. Ten minste houdbaar tot de datum die op de verpakking wordt vermeld.

Studio graphique / Épreuve Interne

Nom	Gamme mobilité - Joint care
Conditionnement	Notice
Référence	701484/N-10
Dimension	180 x 650 mm 40 + 2 mm
Papier	OP Polar Bright
Grammage	40 g/m²
Impression	● Black
Finition pli	40 + 2 mm
Fabrication	Trenker
Créa/modif.	Florine
Date	©trenker • 2024-01-25

Trenker
laboratoires

Avenue Thomas Edison, 32
1402 Thines (Nivelles) • Belgique
T : +32 (0)2 374 02 53
www.trenker.be

All for your mobility

EN

To support formation of joint cartilage¹



Biocondil Glucosamine-chondroitin

Biocondil is available in the form of tablets and sachets.
1 tablet of **Biocondil** contains 750 mg D-glucosamine HCl (625 mg glucosamine), 600 mg chondroitin sulphate and 20 mg Vitamin C (25% RI**).
1 sachet of **Biocondil** contains 1500 mg D-glucosamine HCl (1250 mg glucosamine), 1200 mg chondroitin sulphate and 40 mg Vitamin C (50% RI**).
** Reference intake.

GLUCOSAMINE
Glucosamine hydrochloride is a very pure (>99%) and very stable product. It does not contain any added salt (NaCl or KCl) and has the advantage of having a high glucosamine content.

CHONDROITIN
Chondroitin belongs to the glycosaminoglycans family. Normally it is used in association with glucosamine hydrochloride.

VITAMIN C
Vitamin C assists in normal formation of collagen to ensure normal joint function.

USE
Oral administration
Tablets: 2 tablets per day to be taken at once with a glass of water, preferably during the main meal.
Sachets: 1 sachet a day, dissolve the content of a sachet in a glass of water (or orange juice, milk ...), preferably during the main meal.

PRECAUTIONS
If you experience any adverse reaction, talk to your doctor or pharmacist about it.

PRESENTATION
Packets of 60, 180 or 360 tablets
Packets of 90 or 180 sachets
Also available as DUOPACKS Biocondil + NC2 and Biocondil + Mobilityl Max



NC2 Collagen

NC2 is composed of native (undenatured) type II collagen and 12 mg vitamin C (15% RI**).
** Reference intake.

NATIVE (UNDENATURED) TYPE II COLLAGEN
The type II collagen present in **NC2** is obtained using a unique patented process (low temperature treatment) which preserves the high quality of the protein.
This type of production enables the original structure of type II collagen to be preserved in its native form essential to its effectiveness.

VITAMIN C
Vitamin C contributes to normal collagen formation for the normal function of cartilage.



Bioglucosamine Max Glucosamine

Bioglucosamine Max is available in the form of tablets and sachets, containing 1500 mg D-glucosamine HCl (1250 mg glucosamine) and 20 mg vitamin C (25% RI**).
** Reference intake.

GLUCOSAMINE
Glucosamine hydrochloride is a very pure (>99%) and very stable product. It does not contain any added salt (NaCl or KCl) and has the advantage of having a high glucosamine content.

VITAMIN C
Vitamin C assists in normal formation of collagen to ensure normal joint function.

USE
Oral administration. Suitable for vegans.
Tablets: 1 tablet a day to be taken with a glass of water, preferably during the main meal.
Sachets: 1 sachet a day, dissolve the content of a sachet in a glass of water (or orange juice, milk ...), preferably during the main meal.

PRECAUTIONS
If you experience any adverse reaction, talk to your doctor or pharmacist about it.

PRESENTATION
Packets of 90 tablets.
Packets of 90 sachets.

EN

To maintain joint flexibility²



Mobilityl Max Piperine free A combination of 4 plants

Mobilityl Max is available in the form of tablets, containing 588,75 mg of *Curcuma longa* extract containing 500 mg of curcuminoids, 61,25 mg of *Kaempferia galanga* extract, 50 mg of *Boswellia serrata* extract containing 8,75 mg of AKBA (acetyl-11-keto- β -boswellic acid), 50 mg of *Piper nigrum* oil containing 32,5 mg of β -caryophyllene, 13.2 mg of vitamin C (sodium ascorbate, 16,5% RI**).
** Reference intake

CURCUMA
The patented curcuma extract, BCM-95®, combines curcuminoids with the volatile oil of curcuma for a naturally improved bioavailability.
Anthony B. et al., 2008
²Curcuma extract assists in maintaining joint flexibility.

BOSWELLIA SERRATA
Boswellia serrata extract, contains essential oils and four Boswellic acids, including AKBA (3-acetyl-11-keto-beta-boswellic acid).

KAEMPFERIA GALANGA
The *Kaempferia galanga* rhizome is naturally rich in essential oils and in ethyl-p-methoxycinnamate, a powerful active compound.

PIPER NIGRUM
Piper nigrum oil contains β -caryophyllene which selectively activates the cannabinoid-2 (CB2) receptors.

FOOD SUPPLEMENTS - PRECAUTIONS: Do not exceed the recommended daily dose. Do not substitute for a balanced and varied diet and a healthy lifestyle.

NEW TABLET



SAME EFFICACY

VITAMIN C
Vitamin C assists in normal formation of collagen for normal joint function.

USE
Oral administration
1 tablet a day to be taken with a glass of water.
For a favorable influence, it is advised to take **Mobilityl Max** for a longer period. Suitable for vegans.

PRECAUTIONS
Consult your doctor or pharmacist in case of concomitant use of anticoagulants. It is advisable to obtain a doctor's opinion in case of liver or gall bladder diseases or in case of concomitant use of drugs. Not to be used by pregnant or breastfeeding women or by children less than 18 years old.

PRESENTATION
Packets of 30, 90 and 180 tablets.
Also available as a DUOPACK Biocondil + Mobilityl Max

STORAGE: Keep out of reach of children. To be stored in its original packaging in a cool and dry place. Use preferably before the date mentioned on the packaging.

Alles für Ihre Mobilität

DE

Zur Unterstützung der Bildung von Gelenkknorpel¹



Biocondil Glucosamin-chondroitin

Biocondil gibt es in Tabletten- und in Beutelform.
1 **Biocondil**-Tablette enthält 750 mg D-Glucosamin HCl (625 mg Glucosamin), 600 mg Chondroitinsulfat und 20 mg Vitamin C (25 % RM**)
Ein Beutel **Biocondil** enthält 1500 mg D-Glucosamin HCl (1250 mg Glucosamin), 1200 mg Chondroitinsulfat und 40 mg Vitamin C (50 % RM**)
** Referenzmenge.

GLUCOSAMIN
Glucosaminhydrochlorid ist ein sehr reines (>99 %) und sehr stabiles Produkt. Es enthält kein zugesetztes Salz (NaCl oder KCl) und hat den Vorteil eines hohen Glucosamingehalts.

CHONDROITIN
Chondroitin gehört zur Familie der Glykosaminoglykane. Es wird gewöhnlich in Kombination mit Glucosaminhydrochlorid verwendet.

VITAMIN C
Vitamin C trägt zur normalen Bildung von Kollagen und damit zur Gewährleistung einer normalen Knorpelfunktion bei.

GEBRAUCHSHINWEISE
Orale Verabreichung.
Tabletten: 2 Tabletten pro Tag zur gleichzeitigen Einnahme mit einem Glas Wasser, vorzugsweise während der Hauptmahlzeit.
Beutel: 1 Beutel pro Tag, zum Auflösen in einem Glas Wasser (oder Orangensaft oder Milch usw.), vorzugsweise während der Hauptmahlzeit.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Wenn bei Ihnen irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

DARREICHUNGSFORM
Packungen von 60, 180 oder 360 Tabletten.
Packungen von 90 oder 180 Beuteln.
Auch erhältlich als DUOPACKS Biocondil + NC2 und Biocondil + Mobilityl Max



NC2 Kollagen

NC2 besteht aus nativem Typ-II-Kollagen (nicht denaturiert) und 12 mg Vitamin C (15 % RM**)
** Referenzmenge.

NATIVES TYP-II-KOLLAGEN (NICHT DENATURIERT)
Das in **NC2** vorhandene Typ-II-Kollagen wird durch ein einzigartiges patentiertes Verfahren (Niedrigtemperaturbehandlung) gewonnen, das die hohe Qualität des Proteins bewahrt.
Diese Art der Herstellung ermöglicht es, die ursprüngliche Struktur des Typ-II-Kollagens in seiner nativen Form zu erhalten, was für seine Wirksamkeit unerlässlich ist.

VITAMIN C
Vitamin C trägt zur normalen Bildung von Kollagen und damit zur Gewährleistung einer normalen Knorpelfunktion bei.



Bioglucosamine Max Glucosamin

Bioglucosamine Max ist als Tabletten und in Beuteln erhältlich und enthält 1500 mg D-Glucosamin Hcl (1250 mg Glucosamin) und 20 mg Vitamin C (25 % RM**)
** Referenzmenge.

GLUCOSAMIN
Glucosaminhydrochlorid ist ein sehr reines (>99 %) und sehr stabiles Produkt. Es enthält kein zugesetztes Salz (NaCl oder KCl) und hat den Vorteil eines hohen Glucosamingehalts.

VITAMIN C
Vitamin C trägt zur normalen Bildung von Kollagen und damit zur Gewährleistung einer normalen Knorpelfunktion bei.

GEBRAUCHSHINWEISE
Orale Verabreichung. Für Veganer geeignet.
Tabletten: 1 Tablette pro Tag zur gleichzeitigen Einnahme mit einem Glas Wasser, vorzugsweise während der Hauptmahlzeit.
Beutel: 1 Beutel pro Tag, zum Auflösen in einem Glas Wasser (oder Orangensaft bzw. Milch usw.), vorzugsweise während der Hauptmahlzeit.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Wenn bei Ihnen irgendwelche Nebenwirkungen auftreten, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

DARREICHUNGSFORM
Packung von 90 Tabletten.
Packung von 90 Beuteln.

DE

Zur Unterstützung der Geschmeidigkeit der Gelenke²



Mobilityl Max Piperine free Eine Kombination von 4 Pflanzen

Mobilityl Max liegt in Tablettenform vor und enthält 588,75 mg *Curcuma longa*-Extrakt mit 500 mg Curcuminoiden, 61,25 mg *Kaempferia galanga*-Extrakt, 50 mg *Boswellia serrata*-Extrakt mit 8,75 mg AKBA (Acetyl-11-Keto- β -Boswelliasäure), 50 mg *Piper nigrum*-Öl enthalten 32,5 mg β -Caryophyllen, 13,2 mg Vitamin C (Natriumascorbat, 16,5 % RM*).
** Referenzmenge.

KURKUMA
Das patentierte Kurkumaextrakt BCM-95® kombiniert Curcuminoiden mit flüchtigen Kurkumadien, um eine natürlich verbesserte Bioverfügbarkeit zu erhalten.
Anthony B. et al., 2008
²Kurkumaextrakt hilft, die Beweglichkeit der Gelenke zu erhalten.

BOSWELLIA SERRATA
Das *Boswellia serrata*-Extrakt enthält ätherische Öle und vier Boswelliasäuren, darunter AKBA (3-Acetyl-11-keto-beta-Boswelliasäure).

KAEMPFERIA GALANGA
Das Rhizom von *Kaempferia galanga* ist von Natur aus reich an ätherischen Ölen und Ethyl-p-methoxycinnamat, einem leistungsstarken Wirkstoff.

PIPER NIGRUM
Piper nigrum-Öl enthält β -Karyophyllen, das selektiv Cannabinoid-2- (CB2) Rezeptoren aktiviert.

NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL – VORSICHTSMASSNAHMEN: Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Ist kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und einen gesunden Lebensstil.

NEUE TABLETTE



GLEICHE WIRKSAMKEIT

VITAMIN C
Vitamin C trägt zur normalen Bildung von Kollagen und damit zu einer normalen Knorpelfunktion bei.

GEBRAUCHSHINWEISE
Orale Verabreichung.
1 Kapsel pro Tag, nüchtern mit einem Glas Wasser einzunehmen. Um eine positive Wirkung zu erzielen, ist es ratsam, die Einnahme von **NC2** über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. Das Aussehen des in der Kapsel enthaltenen Pulvers kann erheblich variieren, ohne die Qualität und Wirksamkeit des Produkts zu beeinträchtigen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker im Falle der gleichzeitigen Einnahme gerinnungshemmender Medikamente. Im Falle einer Leber- oder Gallenblasenerkrankung oder der gleichzeitigen Einnahme von Medikamenten sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Nicht bei schwangeren oder stillenden Frauen oder Kindern unter 18 Jahren anwenden.

DARREICHUNGSFORM
Packungen mit 30, 90 und 180 Tabletten.
Auch erhältlich als DUOPACK Biocondil + Mobilityl Max

LAGERUNG: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. In der Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Mindestens haltbar bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Datum.